

Neuropathische voet

vrouw

53 jaar (2004)

neuropathie eci (C2H5OH?)

status na MTP 1-dese rechts

pijnlijke, onbelastbare voet links

Lichamelijk onderzoek

- VARUS stand
- gezwollen
- warm, rood
- alzijdige functie beperking

APRIL 2004



Therapie

Circulair gips, onbelast
juni 2004:



pijn, zwelling
afgenomen

pte weigert OK

Oktober 2004



pijn, varus, instabiel,
onbelastbaar

WAT NU?


na triple a-dese

februari 2005
tevreden



mei 2005

pijn (medioplantair middenvoet), valgus,
slecht belastbaar, moeilijk schoeibaar



WAT NU?


Delay (mamma ca)

Na Lisfranc dese maart 2006
(+ spongiosoplastiek)



Januari 2007

recidief pijn, zwelling, matige belastbaarheid in
OS-A



Mei 2007

progressie klachten, crepitaties, zwelling



Wat nu?


re-arthrodese Lisfranc?

zo laten / moeilijk met OS-A
enkel?

amputeren?

iets anders?

na re-arthrodese Lisfranc + spongiosa plastiek



aug 2007

wond infectie Staph aureus!



Therapie

- heropname
- rust en been hoog
- i.v. antibiotica
- wond snel rustig (< 1 week)

de enkel?



Echter.....

- epiduraal absces (Staph aureus)
- multipele drainages door neurochirurg
- pancreatitis
- pseudocyste
- drainage
- pte doodziek en inoperabel aan voet/enkel


vervolg



okt 2007



dec
2007



Na 8 mnd opname

- pijn li enkel/voet
- slecht belastbaar ondanks hoge OS-A
- akelige valgus
- weinig zwelling, geen roodheid
- crepitaties
- geen aanwijzingen voor infectie voet/enkel

juli 2008



WAT NU
WEER?

volgens mij

- middenvoet geconsolideerd
- destructie BSG
- (status na) infectie
- behandeling in 2 tempi
- OSM uit, nettoyage BSG, gentakralen in
- BSG-dese met retrograde pen en spongiosa
plastiek

andere/betere ideeën?

Na OK 1



Kweek: -

Wond prima

2 wkn later:

- retrograde pen, homologe spongiosa




fraai bloedend bot, schroeven goede grip

Post OK

- vlekkeloze wondgenzing
- 6 weken onbelast gips
- 6 weken loopgips
- hoge orthopedische laars

NU (7 maanden post OK):

- geen pijn
- veel zwelling, gehele onderbeen
- CRP 7; BSE 9; L 7,8



WAT NU WEER???

- pte wil (liever) geen OK
- wachten op de penbreuk en dan overnieuw?
- OSM uit, hoekplaat/nieuwe pen in met spongiosa en GPS?
- amputeren?
- ander/beter idee?

advies

- Opties:
- Re-arthrodese: 1
- Afwachten: 6
- Verwijderen prox schroeven: 10