



Man 50 jaar

Beroep: makelaar

Status na:

- Scarf (St Elsewhere)
- plantair flecterende MT 1 basis osteotomie (idem)
- plantair flecterende Lapidus met cristabot (FF)



klachten

- hoog klachtenniveau, kan 50% werken
- pijn tpv caput MT 1
- pijn tpv caput MT 2 en 3
- beperkte loopafstand
- maximale conservatief behandeld (t/ m OS-A)




Lichamelijk onderzoek

- dig 1 in 45° valgus en 40° extensie
- beweeglijkheid MTP 1 verminderd
- beweeglijkheid MTP 1 matig pijnlijk
- hyperpathie dorso-med. voetrug
- geen hamertenen
- geen eelt MTP 2









Ergo:


- re-re-recidief hallux valgus
- pijnlijk MTP 1
- “transfer laesie”?
- “vegetatieve voet”



Wat nu?

Plan Faber:

- MTP 1 artrodese
- + afbreken TMT 1-2 dese en valgiserende osteotomie aldaar met cristabot (óf net distaal daarvan osteotomie?)
- Weil MT2
- en Weil MT 3?





Andere/betere ideeën?

- Advies: open wig MT1 + dorsiflecterende MTP 1 artrodese
- geen Weil

= verricht

